

FEEDBACK DAL CLIENTE - ZAMBON

RESOCONTO DEL 24 SETTEMBRE 2014 CON IL SIG. ROBERTO ZAMBON

BIOSTAR è stato utilizzato su due vigneti d'uva bianca (della varietà Garganega) nei dintorni di Monteforte d'Alpone, Verona. Il primo vigneto risale al 1989, mentre il secondo vigneto al 1984.

Il prodotto è stato distribuito nel novembre del 2013, in dosi di circa 600 kg per ettaro su entrambi i vigneti. Tuttavia, in primavera, tre ulteriori trattamenti sono stati effettuati sul secondo vigneto con **IDROGRENA** (con atomizzatore); una tanica da 25L per 15.000 metri quadrati (un ettaro e mezzo).

I vigneti sono stati entrambi visitati appena prima del raccolto: in seguito ad invaiatura ed agostamento (il passaggio dalla crescita bacca a bacca maturazione) l'uva risultava soda ed i grappoli erano ben distesi. Inoltre, i tralci erano regolari in lunghezza e nello sviluppo delle internodi. In viticoltura, la crescita ottimale della vite si misura sulla regolarità degli internodi: se sono troppo distanti, può indicare un eccesso di fertilizzanti azotati, e se sono troppo ravvicinati, la vite potrebbe aver sofferto da stress.

La raccolta finale si è verificata intorno al 20 settembre 2014.

Risultati Finali

PRIMO vigneto (**BIOSTAR** a novembre 2013)

- Produzione.....190 quintali
- Grado Babo*.....16
- Percentuale di marciume.....20%

SECONDO vigneto (**BIOSTAR** novembre 2013 + **IDROGRENA** in primavera)

- Produzione.....170 quintali
- Grado Babo*.....17
- Percentuale di marciume.....5%



*unità di gradazione del mostimetro Babo (dal nome del suo ideatore, prof. August W.F. von Babo) che misura la quantità in peso di zucchero contenuto nel mosto, riferita a 100g.

